



島根整肢学園 西部島根医療センター

◆ オーラルヘルスアセスメントツール

ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL (OHAT)

(Chalmers JM et al., 2005)

ID:		氏名:		評価日: / /			
項目		0=健全		1=やや不良		2=病的	スコア
口唇		正常, 湿潤, ピンク		乾燥, ひび割れ, 口角の発赤		腫脹や腫瘍, 赤色斑, 白色斑, 潰瘍性出血, 口角からの出血, 潰瘍	
舌		正常, 湿潤, ピンク		不整, 亀裂, 発赤, 舌苔付着		赤色斑, 白色斑, 潰瘍, 腫脹	
歯肉・粘膜		正常, 湿潤, ピンク, 出血なし		乾燥, 光沢, 粗造, 発赤 部分的な(1-6歯分)腫脹 義歯下の一部潰瘍		腫脹, 出血(7歯分以上) 歯の動揺, 潰瘍 白色斑, 発赤, 圧痛	
唾液		湿潤 漿液性		乾燥, べたつく粘膜, 少量の唾液 口渇感若干あり		赤く干からびた状態 唾液はほぼなし, 粘性の高い唾液 口渇感あり	
残存歯 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		歯・歯根の う蝕または破折なし		3本以下の う蝕, 歯の破折, 残根, 咬耗		4本以上のう蝕, 歯の破折, 残根, 非常に強い咬耗 義歯使用無しで3本以下の残存歯	
義歯 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常 義歯, 人工歯の破折なし 普通に装着できる状態		一部位の義歯, 人工歯の破折 毎日1-2時間の装着のみ可能		二部位以上の義歯, 人工歯の破折 義歯紛失, 義歯不適合のため未装着 義歯接着剤が必要	
口腔清掃		口腔清掃状態良好 食渣, 歯石, プラークなし		1-2部位に 食渣, 歯石, プラークあり 若干口臭あり		多くの部位に 食渣, 歯石, プラークあり 強い口臭あり	
歯痛	 	疼痛を示す言動的, 身体的な 兆候なし	 	疼痛を示す言動的な兆候あり: 顔を引きつらせる, 口唇を噛む 食事しない, 攻撃的になる	 	疼痛を示す身体的な兆候あり: 頬, 歯肉の腫脹, 歯の破折, 潰瘍, 歯肉下膿瘍。言動的な徴候もあり	
							合計
歯科受診 (要 ・ 不要)							
再評価予定日 / /							

摂食・口腔ケア個人カード

105号室：○○ ○○

【摂取方法】 経口 **注入**

【水分摂取】 コップ 吸い飲み

【トロミ】 不要
必要 …

【姿勢 (W/C、ギャッジの角度等)】

W/C 乗車時の角度を 40度にする。

【食事介助での注意点】

○W/Cの乗車時間は2時間とする。

【口腔ケア】

- 吸引付き歯ブラシ使用
- 含嗽不可のため、うがい禁

摂食・口腔ケア個人カード

105号室：○○ ○○

【摂取方法】 **経口** 注入

【水分摂取】 **コップ** **吸い飲み**

【トロミ】 不要
必要 …

【姿勢 (W/C、ギャッジの角度等)】

W/C 乗車

【食事介助での注意点】

- 水分はコップ2杯分摂取する。
- W/C 乗車時間は3時間以内とする。
- 注意散漫になるとムセやすいので注意する。
- 皿に食事が残っていることがあるので、仕上げが必要。

【口腔ケア】

- 吸引付き歯ブラシ使用

摂食・口腔ケア個人カード

105号室：○○ ○○

【摂取方法】 **経口** **注入** ※昼食、おやつのみ経口

【水分摂取】 コップ **吸い飲み**

【トロミ】 **不要**
必要 …

【姿勢 (W/C、ギャッジの角度等)】

W/C 乗車の際には、きちんとお尻が入っているかを確認する。

【食事介助での注意点】

- 摂取前に口元をマッサージする。
- 顔が上を向くようにタオルで調整する。

【口腔ケア】

- ブラッシング後、吸引下にて含嗽。
- ケア後、オーラルバランス塗布

摂食・口腔ケア個人カード

105号室：○○ ○○

【摂取方法】 **経口** **注入** ※おやつのみ経口

【水分摂取】 コップ **吸い飲み**

【トロミ】 **不要**
必要 …

【姿勢 (W/C、ギャッジの角度等)】

注入時→ベッドギャッジアップもしくは W/C 乗車
おやつ時→可能な限り、W/C 乗車の方が飲み込みがよい。

【食事介助での注意点】

- 摂取前に口腔内の吸引を実施する。

【口腔ケア】

- ブラッシング後、吸引下にて含嗽。
- ケア後、オーラルバランス塗布
- 歯列不正、歯肉肥大、前歯部カヒ (+)